

ВАКЦИНА ПРОТИ ВІРУСУ COVID-19 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 5 РОКІВ

ЩО ВАМ СЛІД ЗНАТИ

Пандемія вірусу COVID-19 стосується всіх, дітей також. Вакцини «Пфайзер» і «Модерна» проти COVID-19 наявні для дітей віком від 6 місяців. Для кожної дитини безпечніше отримати щеплення проти COVID-19, аніж не отримати його.



Чи безпечна вакцина?

Так. Тисячі дітей прийняли участь у тестуваннях вакцини, й незалежні найковці та агенства схвалили її. (1)

Чи може моя дитина отримати також інші щеплення під час одного прийому?


Так. Отримати інші щеплення під час одного прийому - безпечно. (2)

Чи є побічні дії?

Побічні дії є звичайним явищем, до них належать: біль у руці, втома, головний біль, лихоманка, озноб, а також біль у м'язах або суглобах. (3)

Чи потрібно вакцинувати мою дитину, якщо її матір пройшла щеплення під час вагітності й/або грудного годування?

Так. Рекомендується вакцинувати вашу дитину якомога скоріше, щоб захистити її від важкого перебігу хвороби, навіть якщо дитина не належить до групи ризику. (2)



- Якщо в вас є запитання, зверніться з ними до вашого педіатра.
- Відвідайте свого педіатра, поліклініку чи аптеку. Переконайтеся, що на локації, де проводять щеплення, є доза вакцин «Пфайзер» або «Модерна», що відповідає віку вашої дитини.
- **Вакцина безкоштовна. Вам не потрібне медичне страхування, й вам не треба буде платити.**
- Якщо вашій дитині дали вакцину «Пфайзер» - поверніться через 21 день на друге щеплення для дитини і потім ще через 56 днів - на третє. Якщо ваша дитина отримала вакцину «Модерна», поверніться через 28 днів на друге щеплення.
- Збережіть карту вакцинації та принесіть її на другий і третій прийоми для щеплення. (4)

ЯК ВТІШИТИ ДИТИНУ В МОМЕНТ ЩЕПЛЕННЯ



- В день прийому поговоріть про події дня та заплануйте щось цікаве після щеплення.
- Спробуйте тримати дитину так, наче обіймаєте, а не утримуєте її. Грудне годування або дурник можуть допомогти заспокоїти дитину під час уколу.
- Візьміть зі собою речі, що втішать і відволічуть дитину, наприклад книжки й іграшки.
- Попросіть свого лікаря скористатися пристроєм "Buzzy Bee", іншим аплікатором для блокування болю від уколу або знеболююче – для того, щоб полегшити дискомфорт.
- Будьте й самі спокійні та позитивні. Так ви надихнете свою дитину чинити так само.

Дізнайтеся більше за посиланням: www.boostoregon.org/comfort

Що відомо про довгострокові побічні дії?

Довгострокові побічні дії від будь-якої вакцини малоімовірні, як і від вакцини проти Covid-19. Згідно досліджень і даних спостережень побічні ефекти зазвичай виникають впродовж 6 тижнів після щеплення. Понад 200 мільйонів американців і понад 5 мільярдів людей у світі отримали щеплення від Covid-19 і ні в кого не виявили довготривалих побічних дій. (5) Продовжуються спостереження безпеки з метою відстежити рідкісну побічну дію – запальне враження серця (міокардит) і інші ймовірні рідкісні побічні дії, які можливо виявити лише після введення мільйонів доз. Під час випробувань вакцини не було виявлено жодної побічної дії. (6) Якщо в вашій дитини виникне алергічна реакція, ви дізнаєтеся про це одразу після уколу. Тому за вашою дитиною спостерігатимуть впродовж 15–30 хвилин після щеплення. (5)



Список джерел:

1. Робоча Наукова Група з Перевірок Безпеки в Західних Штатах США: <https://drive.google.com/file/d/1Nklm7aMqcyNrOrxZ-19-fGy-8i2wkxp1/view>
2. Центри Контролю й Профілактики Захворювань: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq-children.html>
3. Американська Академія Педіатрії: <https://publications.aap.org/aapnews/news/20649?autologincheck=redirected>
4. Американська Академія Педіатрії: <https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Getting-Your-Child-Ready-for-the-COVID-19-Vaccine.aspx>
5. Центри Контролю і Профілактики Захворювань: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html>
6. Управління Санітарного Нагляду за Якістю Продуктів і Медикаментів у США: <https://www.fda.gov/media/159228/download>



Для отримання додаткової інформації заходьте на: www.boostoregon.org